

" ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección personal adecuado como camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines con zapatos o botas resistentes al agua. Se recomienda utilizar un overol sobre la ropa, que cubra los guantes y botas para evitar infiltración del producto al cuerpo. Los guantes que dan mayor protección en el manejo de productos químicos agrícolas son los de nitrilo, butilo y/o neopreno. Usar goggles o mascarilla protectora durante la aplicación, así como gorra o sombrero de plástico. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación. No destape las boquillas con la boca. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, quítese el overol y colóquelo en un lugar ventilado, la ropa utilizada durante la aplicación debe lavarse con agua y jabón. Los guantes utilizados deben lavarse antes y después de usarlos. Báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación retirar al paciente a un lugar fresco donde corra el aire y esté sombreado, lejos del lugar donde se intoxicó. En caso de que el producto caiga en la piel, lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua y jabón y retírese la ropa contaminada. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua limpia o borricada, por lo menos durante 15 minutos. En caso de ingestión, **NO INDUZCA AL VÓMITO**, si la persona está **CONSCIENTE** lave la boca con buches de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasas, administre carbón activado suspendido a dosis de un gramo por kilogramo de peso. Administre un catártico (sulfato de sodio o magnesio) a dosis de 1 gramo por kilogramo de peso. Si la persona está **INCONSCIENTE** no le provoque el vómito, no trate de introducirla nada en la boca; acuéstelo al paciente cuidando que la boca y la nariz estén libres de obstáculos y colóquelo en un lugar fresco y bien ventilado, lejos del área de contaminación.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Producto formulado a base de tebuconazole, que pertenece al grupo químico de los Triazolos.
Síntomas de intoxicación: Los síntomas no son específicos, por lo general se presentan como hiperactividad seguida de una sedación. **Antídoto y tratamiento:** En caso de ingestión hacer lavado gástrico, si es necesario administrar fluidos en abundancia, tratamiento sintomático.



Esta empresa es miembro de la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria, A.C., En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01 800 009280; 01 (55) 5598 66 59 y 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Este producto es ligeramente tóxico para peces, abejas y animales. Durante el manejo del producto evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra, aserrín o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlos al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado mas cercano. Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación, (salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide). Maneje el envase vacío y los residuos conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Manténgase en un lugar fresco y ventilado. No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, semillas, ropa y forrajes. Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use. Almacéñese en un lugar seguro, bajo llave y en la sombra.

GARANTÍA: Helm de México S.A. Garantiza el contenido exacto de los componentes indicados en la composición porcentual en esta etiqueta. El expendedor no obliga ninguna garantía táctica o expresamente al uso de este producto. El comprador asume todo riesgo en cuanto al empleo y manejo del producto.

" ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUI RECOMENDADOS "



**TEBUCONAZOLE
FUNGICIDA AGRÍCOLA / CONCENTRADO EMULSIONABLE
COMPOSICIÓN PORCENTUAL**

INGREDIENTE ACTIVO: Tebuconazole: alfa-tertiari-butil-alfa-(p-clorofenetil)-1H-1,2,4-triazole-1-etanol No menos de : 25.00 (Equivalente a 250 g. de i.a./lt.)

INGREDIENTES INERTES: Emulsionante, antiespumante, cosolvente y diluyente. No mas de : 75.00 **TOTAL:** 100%

REG. RSCO-FUNG-0349-304-009-025 **CONTENIDO NETO: 1 L.**
FECHA DE VENCIMIENTO: INDETERMINADA

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS: TEBUCUR® Es un producto ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación, contacto con la piel y ojos. **"NO SE TRANSPORTE, NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES, MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS, NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN, NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS, NO SE UTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE"**.

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de elaboración.

Distribuido y Comercializado por:
HELM DE MÉXICO, S.A.



Protón No.2 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan, Estado de México. Tel: (55) 5228 9900 Fax: (55) 5300 5731.
Página Web: www.helm-mexico.com.mx
Email: helm_agro@helm-mexico.com.mx
Hecho en Brasil.

Lote No:

Fecha de elaboración:

Envasado por Servicios Químicos y Maquilas S.A. de C.V. Vialidad interior Manzana 4 Lote 14 Parque Industrial Jilotepec, Estado de México, C.P. 54240, Tel. 01 (761) 734 2958. Para: **HELM DE MÉXICO, S.A.**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV

INSTRUCCIONES DE USO, SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN

TEBUCUR® es un fungicida sistémico para el control de la roya amarilla y sigatoka negra en los cultivos aquí indicados:

CULTIVO	PLAGAS	DOSES (L/ha)	OBSERVACIONES
CEBADA (35)	ROYA AMARILLA <i>Puccinia striiformis f. Sp. hordei</i>	0.4-0.75	Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad en la hoja bandera.
PLATANO (0)	SIGATOKA NEGRA <i>Mycosphaerella fijiensis var. difformis</i>	0.4 - 0.5 Adicionar 2 litros de citrolina agrícola	Inicio de aplicaciones al acercarse la floración de las plantaciones a tratar. Realizar de 6-8 aplicaciones por temporada.

() = intervalo de seguridad en días.
Tiempo de reentrada: 24 horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Llenar el tanque limpio hasta la mitad con agua pura, agregar la dosis necesaria de **TEBUCUR®** enjuagar el envase vacío tres veces agregando el agua del lavado al tanque de aplicación y completar con agua hasta su capacidad manteniendo en constante agitación. Según sea el equipo de aplicación, procure que el follaje quede completamente cubierto aplicando la dosis recomendada para el cultivo en el volumen de agua que sea necesario para dar una buena cobertura al follaje.

CONTRAINDICACIONES :

No aplicar en hotas de calor intenso ni cuando existan vientos fuertes (mayores de 15 km / h).

FITOTOXICIDAD :

Este producto no es fitotóxico empleado a las dosis y en los cultivos aquí recomendados.

INCOMPATIBILIDAD :

No se ha detectado incompatibilidad con los agroquímicos comúnmente usados, pero para mayor seguridad se recomienda hacer pruebas previas en campo cuando se desee mezclar con otros productos. Se recomienda que para las mezclas se utilicen productos que cuenten con registro vigente y estén autorizados por la Autoridad competente en los cultivos que aquí se indican.



LIGERAMENTE TÓXICO

