

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, gafas o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación en el mismo campo tratado lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto con la piel, lávese la parte afectada con agua y jabón, si hubo contacto con los ojos lave con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona esta consciente, provoque el vómito administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: ORGANOFOSFORADOS (TIOSFATO).

Síntomas de intoxicación.- Leves.- dolor de cabeza, visión borrosa, ansiedad, temblor, calambres, vómito, diarrea y dolor abdominal. Severos.- dificultad respiratoria, congestión bronquial, edema pulmonar, debilidad severa, pérdida de control de esfínteres y convulsiones.

Tratamiento y antídoto: En caso de adultos, suministrar 2 comprimidos de 0,5 mg de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los síntomas sean severos, administrar de 2 a 5 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente, cada 5 a 15 minutos, hasta completa atropinización.

En caso de intoxicación llame a los teléfonos de emergencia del Servicio de Información Toxicológica de la AMIFAC Tel.55 98 66 59,56 11 26 34. Lada sin costo 01 800 0928 00. Las 24 horas del día los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

No contamine con este producto agua corriente, depósitos, o fuentes de agua. Después de realizar el Triple Lavado, maneje los envases vacíos conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas. Este producto es tóxico para aves y peces.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

GARANTÍA :

HELM DE MÉXICO, S.A. Garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS



TAMIDOR

METAMIDOFOS

Insecticida acaricida / Concentrado Emulsionable
COMPOSICION PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO: METAMIDOFOS: O,S-Dimetil fosforo amidotoato (Equivalente a 600 g de I.A./L) % EN PESO
No menos de: 48.30 %

INGREDIENTES INERTES: Solventes, emulsificantes y compuestos relacionados. No mas de: 51.70 %
Total: 100 %

REG. RSCO-INAC-0144-015-009-048
FECHA DE VENCIMIENTO: INDETERMINADA CONTENIDO NETO: 1 L.

CUIDADO VENENO

ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS: TAMIDOR® es un producto ALTAMENTE TÓXICO, para humanos y animales domésticos, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES". "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS". "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN". "NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS". "NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE".

Fecha de fabricación:
Fecha de caducidad: 2 años después de su fecha de fabricación.
Lote No. :



HECHO EN MÉXICO



Distribuido y comercializado por:
HELM DE MÉXICO, S.A.
Protón No.2 Parque Ind. Naucalpan, 53489 Naucalpan Edo. de México.
Tel: (55)5228 9900 Ext.296 Fax: (55)5300 5731
Página Web: www.helm-mexico.com.mx
e-mail: helm@helm-mexico.com.mx

INSTRUCCIONES DE USO

¡ Siempre calibre su equipo de aplicación !

TAMIDOR® es un insecticida organofosforado de uso agrícola, recomendado para el combate y control de las plagas que se indican en los siguientes cultivos:

| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ARAÑA ROJA | <i>Tetranychus spp.</i> | MARIPOSITA BLANCA DE LA COL | <i>Pieris rapae</i> |
| CATARINITA DE LA PAPA | <i>Leptinotarsa undecimlineata</i> | MEDIDOR DE LA HOJA | <i>Alabama argillacea</i> |
| CHICHARRITA | <i>Empoasca spp.</i> | MINADOR DE LA HOJA | <i>Liriomyza spp.</i> |
| CHICHARRITA DEL BETABEL | <i>Eutettix tenellus</i> | MOSQUITA BLANCA | <i>Bemisia tabaci</i> |
| CHINCHE PEQUEÑA DEL JITOMATE | <i>Cyrtopeltis notatus</i> | MOSQUITA BLANCA | <i>Trialeurodes spp.</i> |
| CHINCHE APOSTOSA | <i>Euschistus spp.</i> | PALOMILLA DE LA PAPA | <i>Phthorimaea operculella</i> |
| CHINCHE ARLQUÍN DE LA COL | <i>Murgantia histrionica</i> | PALOMILLA DORSO DE DIAMANTE | <i>Plutella xylostella</i> |
| CHINCHE LIGUS | <i>Lygus spp.</i> | PULGA SALTONA | <i>Phyllotreta spp.</i> |
| CHINCHE RÁPIDA | <i>Creontiades spp.</i> | PULGA SALTONA NEGRA | <i>Chaetocnema spp.</i> |
| CHINCHE VERDE | <i>Nezara viridula</i> | PULGA SALTONA NEGRA | <i>Epitrix spp.</i> |
| DIABRÓTICA O DORADILLA | <i>Diabrotica spp.</i> | PULGA SALTONA NEGRA | <i>Spananogonicus albofasciatus</i> |
| GUSANO DEL CORAZÓN DE LA COL | <i>Copitarsia consueta</i> | PULGÓN | <i>Aphis spp.</i> |
| GUSANO DEL CUERNO DEL JITOMATE | <i>Manduca quinquemaculata</i> | PULGÓN DE LA COL | <i>Brevicoryne brassicae</i> |
| GUSANO DEL FRUTO | <i>Heliothis zea</i> | PULGÓN DEL ALGODÓN Y DEL MELÓN | <i>Aphis gossypii</i> |
| GUSANO FALSO MEDIDOR | <i>Trichoplusia ni</i> | PULGÓN MYZUS | <i>Myzus persicae</i> |
| GUSANO PELLUDO | <i>Estigmene acrea</i> | TRIPS | <i>Frankliniella spp.</i> |
| GUSANO RAYADO DE LA COL | <i>Leptophobia arripa</i> | TRIPS NEGRO | <i>Caliothrips phaseoli</i> |
| GUSANO SOLDADO | <i>Spodoptera exigua</i> | | |

| CULTIVO (Intervalo de seguridad en días) | DOSIS (L/ha.) | CULTIVO (Intervalo de seguridad en días) | DOSIS (L/ha.) |
|--|---------------|--|-----------------------|
| ALGODONERO (50) | 1,0-1,5 | JITOMATE (7) | 1,0-1,5 |
| BERENJENA (14) | 1,0-1,5 | LECHUGA (14) | 1,0-1,5 |
| BROCOLI (14) | 1,0-1,5 | MELÓN (7) | 1,0-1,5 |
| CHILE (14) | 1,0-1,5 | ORNAMENTALES (SL) | 125 cc/ 100 L de agua |
| COL (35) | 1,0-1,5 | PAPA (14) | 1,0-1,5 |
| COL DE BRUSELAS (14) | 1,0-1,5 | PEPINO (7) | 1,0-1,5 |
| COLIFLOR (28) | 1,0-1,5 | | |

SL= SIN LIMITE.
PERIODO DE REENTRADA: 24 horas después de la aplicación

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Mida cuidadosamente la cantidad de TAMIDOR® y haga una premezcla con un poco agua hasta obtener una solución homogénea. Llene la mitad del tanque de la aspersora, agregue la premezcla, agite constantemente, utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos), y complete con la cantidad de agua calculada en la calibración. En cultivos bajos, por ejemplo lechuga y equipo de aplicación terrestre, diluya la dosis recomendada en 200 a 400 L agua/ha, y si la aplicación es con equipo aéreo, emplear de 60 a 80 L agua/ha.

CONTRAINDICACIONES : No pastorear ganado en áreas tratadas con este producto. No se aplique en las horas de calor intenso ni cuando el viento sea fuerte (más de 10 Km/h).
INCOMPATIBILIDAD: TAMIDOR® No es compatible con materiales de reacción alcalina. La mezcla con otros productos deberá ser con aquellos que cuenten con registro vigente y que estén autorizados para los cultivos aquí indicados.
FITOTÓXICIDAD: TAMIDOR® no es fitotóxico para los cultivos y dosis recomendados en esta etiqueta.



ALTAMENTE TÓXICO

